



INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL  
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA  
EDITAL 02/2022/2023  
REFERENTE À 1ª FASE DO PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA  
RESPOSTAS DOS RECURSOS

**ÁREA DE ATUAÇÃO: CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA**

Número de protocolo do Recurso: 001/2022

Número de CPF:

**Questão: 16**

**Decisão: INDEFERIDO RECURSO**

Resposta Correta Mantem-se o GABARITO “ B”.

Comentário:

De acordo com o documento *Sistematização do atendimento ao recém-nascido com suspeita ou diagnóstico de cardiopatia congênita* publicado pela SBP em 11 de agosto de 2022, na página 6, O protocolo do teste do coraçãozinho explica:

- **Teste duvidoso:** SpO2 entre 90% e 94% ou uma diferença entre as medidas do membro superior direito e o membro inferior maior ou igual a 4%. Nesta situação, o teste deve ser realizado novamente após uma hora por até duas vezes. Caso as medidas de oximetria se mantenham nestes valores mesmo após a terceira avaliação, o teste será considerado positivo e o RN deverá ser submetido à avaliação cardiológica/ ecocardiográfica. A realização do reteste nesta situação mostrou-se importante por reduzir consideravelmente o número de falsos positivo com o teste.

O caso descrito na questão 16 apresenta exatamente um teste duvidoso, saturação de 92% no MSD e uma diferença de 4% com o MID. A conduta neste caso é repetir em 1 hora, podendo ser repetido por até duas vezes e confirmando-se o diagnóstico encaminhar para ecocardiograma antes da alta.

O paciente descrito além de assintomático, não apresenta hipoxemia severa que necessite teste de hiperóxia para fazer diagnóstico diferencial com doenças pulmonares.

Se o teste do coraçãozinho se confirmar neste caso, devemos pensar em cardiopatia congênita com circulação sistêmica canal- depende o que justificaria a diferença de saturação entre MSD e MID.

---

**ÁREA DE ATUAÇÃO: HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA**

Número de Protocolo do Recurso: 01/2022

Número do CPF: 023.125.250-11

**Questão nº 01**

Resposta da Comissão: **DEFERIDO RECURSO** Resposta correta “A”.

**Questão nº 12.**

Resposta da Comissão: **DEFERIDO RECURSO.** Anulada a questão

Número do Protocolo: 02/2022

Número do CPF: 004.005.570.10

**Questão nº 21**

Resposta da Comissão: **INDEFERIDO RECURSO.**

---

**PRM: CARDIOLOGIA**

**Número de Protocolo do Recurso: 01/2022**

**Número do CPF: 036.631.950.74**

**Questão nº 15**

**Resposta da Comissão: INDEFERIDO RECURSO**

A pergunta refere-se ao tratamento genérico NA MAIORIA DAS VEZES da alcalose metabólica.

Justificativa de cada uma das opções:

- A) Exceto em situações de insuficiência renal, a alcalose metabólica costuma estar associada a hipocalcemia, que perpetua o distúrbio. Assim, é muito comum haver necessidade de reposição de potássio.
- B) NAS ALCALOSSES METABÓLICAS A HIPOVOLEMIA OU HIPOTENSÃO, COSTUMA HAVER REDUÇÃO DO CLORO URINÁRIO. Neste caso, a reposição volêmica é importante. Não é o caso quando o cloro urinário é alto.
- C) Novamente a reposição de cloro é indicada em situações de hipovolemia. Nas alcaloses metabólicas associadas a excesso de ação mineralocorticoide, a reposição de cloro não é indicada.
- D) Reposição de fósforo não está indicado nas alcaloses metabólicas.

**Número de Protocolo do Recurso: 01/2022**

**Número do CPF: 007.478.460.90**

**Questão nº 34**

**Resposta da Comissão: DEFERIDO RECURSO. Anulada questão.**

**Questão nº 45**

Resposta da Comissão: **INDEFERIDO RECURSO.**

A trombocitopenia induzida por heparina pode ocorrer antes do quinto dia de uso de heparina em algumas situações como uso prévio recente de heparina.

A resposta "C" não fornece a conduta inicial total a ser tomada, mas apenas parte dessa conduta, o que mantém a opção como correta.

**Questão nº 46**

A afirmação III confirma que pacientes que moram em clínicas geriátricas e frequentem clínicas de hemodiálise quando desenvolvem quadro clínico sugestivo de broncopneumonia devem SEMPRE ter espectro de antibióticos que cubram germes hospitalares.

Mesmo considerando as ponderações do candidato, não podemos generalizar o uso de antibiótico que cubram germes hospitalares para a totalidade desses pacientes. Portanto a afirmativa III está incorreta e o Gabarito se mantém com a resposta sendo a letra “C”.

**Porto Alegre, novembro de 2022.**

**Comissão de Residência Médica – COREME IC/FUC**